



## 10. Servicios de Salud Reproductiva

Los servicios de salud reproductiva son de suma importancia para la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil. La captación temprana de las mujeres embarazadas, el adecuado control prenatal y la atención profesional del parto constituyen acciones prioritarias para que el sistema de salud logre reducir la brecha existente en el acceso real a servicios de salud reproductiva de las mujeres.

## 10.1 Atención prenatal

El cuadro 10.1 presenta información referente al uso, por parte de las mujeres, de los servicios de salud reproductiva, indicando el mes de inicio de atenciones prenatales y el número de atenciones reportados por las mujeres para los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años.

Como muestra la información del cuadro 10.1, un 88,7% de las mujeres tuvo su primer control prenatal en el primer trimestre. En cuanto al número de controles prenatales, el 64,9% tuvo entre 7 y 9 controles, mientras que una de cada cinco mujeres tuvo entre 3 y 6 controles prenatales. El control prenatal adecuado, definido para todas aquellas mujeres que tuvieron como mínimo 3 controles y uno de ellos en el primer trimestre, es de 88,4%, lo que implica que el 11,6% de las mujeres no tuvo acceso a un control adecuado durante su embarazo. Esto, sin embargo, representa una mejora con respecto a 1999, cuando un 18,8% de las mujeres no tuvo acceso a un control adecuado.

CUADRO 10.1: **Porcentaje de control prenatal adecuado.**

- Mujeres con al menos un parto en los últimos 5 años-

Variables/características de las mujeres	ENSR-99 (N=411)	ENSS-10 (N=326)
<b>Primer control prenatal</b>		
I trimestre	80,5	88,7
II trimestre	13,4	9,3
III trimestre	1,5	2,0
<b>Número de controles</b>		
Menos de 3	1,2	1,9
De 3 a 6	27,0	20,0
De 7 a 9	49,9	64,9
Más de 10	17,3	12,0
<b>Control prenatal adecuado (1)</b>	<b>81,2</b>	<b>88,4</b>

(1) Mujeres que tuvieron como mínimo 3 controles prenatales y al menos uno de ellos en el primer trimestre.

El cuadro 10.2 muestra los porcentajes según zona de residencia y nivel educativo. La mayor captación temprana ocurre en el resto del país rural (91,9%), mientras que la región central rural muestra el porcentaje más bajo de atención en el primer trimestre (85,9%). El número de controles prenatales presenta una distribución similar: en el resto del país rural se observa el mayor porcentaje de mujeres que tuvieron entre 7 y 9 controles (74,6%), mientras que en la región central rural el porcentaje es más bajo (58,3%).

Según el nivel educativo de las mujeres, los porcentajes de atención prenatal oportuna más altos se encuentran en mujeres con estudios universitarios (92%). Las

mujeres sin escolaridad tuvieron, en un 79,8%, entre 7 y 9 controles prenatales, mientras que el 76,9% de ellas fue captado tempranamente; esto quiere decir que aproximadamente una de cada cuatro mujeres con este nivel

educativo no tuvo acceso a un control adecuado durante su embarazo. Adicionalmente, la información indica que las madres adolescentes también figuran como un grupo con menor cobertura de atención prenatal.

CUADRO 10.2: Distribución porcentual de las mujeres por atención prenatal del embarazo más reciente, número de controles, y control adecuado según zona de residencia y nivel educativo.

Mujeres de 15 a 49 años con al menos un parto en los últimos 5 años								
(N=326)								
Variables	Primer control prenatal			Número de controles				Control prenatal adecuado (1)
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Menos de 3	De 3 a 6	De 7 a 9	Más de 10	
<b>Zona de residencia</b>								
Central urbana	88,7	10,3	1,0	6,7	14,2	62,4	21,5	88,1
Central rural	85,9	11,0	3,1	1,9	33,0	58,3	6,9	85,9
Resto del país urbano	86,0	11,1	2,8	4,4	21,5	62,1	9,7	86,0
Resto del país rural	91,9	5,5	2,7	2,7	20,0	74,6	2,5	91,9
<b>Nivel educativo</b>								
Ninguno	76,9	23,1	-	-	9,3	79,8	10,9	76,9
Primaria	88,3	8,6	3,1	2,8	26,6	61,3	7,6	88,3
Secundaria	88,6	10,0	1,4	1,5	19,0	65,9	12,9	88,0
Universitaria	92,0	6,1	1,9	1,5	10,3	67,0	21,2	92,0

(1) Mujeres que tuvieron como mínimo 3 controles prenatales y al menos uno de ellos en el primer trimestre.

## 10.2 Atención del parto

Aproximadamente el 98% de la totalidad de los partos se atendió en centros de salud públicos, y el 95,3% recibió atención profesional durante el parto. El porcentaje de atenciones reportadas para los centros privados es muy bajo y solamente alcanza el 1,7%.

No se observan diferencias importantes en cuanto a la atención del parto en centros de salud públicos según zona de residencia y nivel educativo de las mujeres.

En cuanto a la atención profesional del parto, el resto del país rural presenta el porcentaje más bajo, con un 91,1%, mientras que, en relación con el nivel educativo, las mujeres con primaria reportan el porcentaje de atención profesional más bajo, 91,3%. Esto, sin embargo, no implica diferencias significativas entre los grupos.

CUADRO 10.3: **Porcentaje de atención profesional del parto y lugar del parto.** -Mujeres de 15 a 49 años con al menos un parto en los últimos 5 años-

Variables	Lugar del parto			Persona que atendió el parto					Parto con atención profesional
	Hospital/ clínica pública	Hospital/ clínica privada	No en hospital /clínica	Médico	Enfermera obstetra	Enfermera	No personal médico	NS/NR	
TOTAL (N=326)	<b>98,1</b>	<b>1,7</b>	<b>-</b>	<b>51,6</b>	<b>40,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>95,3</b>
<b>Edad</b>									
Menos de 30	99,4	0,3	0,3	47,9	43,7	2,3	1,3	4,8	<b>93,9</b>
Más de 30	95,9	4,1	-	58,0	35,0	4,8	1,3	0,8	<b>97,8</b>
<b>Zona de residencia</b>									
Central urbana	97,2	2,8	-	55,2	40,9	1,8	0,9	1,2	<b>97,9</b>
Central rural	95,7	3,1	1,2	48,9	39,8	6,1	0,9	4,3	<b>94,8</b>
Resto del país urbano	100,0	-	-	51,9	42,4	2,3	3,4	-	<b>96,6</b>
Resto del país rural	100,0	-	-	47,5	39,4	4,2	1,1	7,8	<b>91,1</b>
<b>Nivel educativo</b>									
Ninguno	100,0	-	-	62,3	31,2	-	-	6,4	<b>93,5</b>
Primaria	99,1	0,9	-	52,9	33,5	4,9	3,3	5,4	<b>91,3</b>
Secundaria	97,3	2,2	0,4	52,3	41,9	3,3	0,3	2,2	<b>97,5</b>
Universitaria	97,6	2,4	-	44,6	53,8	-	-	1,7	<b>98,4</b>